

Avec votre médecin, parlez prévention,

parlez



VACCINATION

La vaccination est un geste simple et reste le moyen le plus efficace pour prévenir les formes graves des infections . Je me vaccine, je me protège, je nous protège.

LES FEMMES ENCEINTES



Grippe
Covid
Coqueluche
VRS (virus respiratoire syncytial)

- Avant l'arrêt de la contraception : mise à jour de la vaccination dont ROR (rougeole - oreillon - rubéole) et varicelle
- Pendant la grossesse
 - dès le 1er trimestre : grippe et covid
 - à partir du 2e trimestre : coqueluche
 - au 8ème mois : VRS (notamment bronchiolite)

LES NOURRISSONS



VRS
Coqueluche
Coconing

- Dès la naissance : traitement préventif contre la bronchiolite (bébés nés entre octobre et février)
- 1ères vaccinations dès 2 mois
- Vaccinations des professionnels de santé et de la petite enfance
- Vaccinations de l'entourage familial

**Epidémie coqueluche en cours :
rappel si dernière injection date de + 5 ans**

- pour les professionnels de la petite enfance
- pour l'entourage familial si absence de vaccination de la mère pendant la grossesse



La vaccination contre la coqueluche est à faire à CHAQUE grossesse même si la mère a été vaccinée peu de temps avant de tomber enceinte. Si la mère n'a pas été vaccinée pendant la grossesse, la vaccination doit se faire avant la sortie de la maternité même si elle allaite son enfant.



L'ENTOURAGE DES PLUS FRAGILES



Je vérifie mes vaccinations dont ROR et varicelle



Je me vaccine contre :

- la grippe
- le covid
- la coqueluche
- Pour les - 25 ans et dernier rappel date de + 5 ans
- Pour les + 25 ans et dernier rappel date de + 10 ans



Un rappel vaccinal contre la coqueluche est recommandé pour les adolescents entre 11 et 13 ans et pour tous les adultes de 25 ans (avec rattrapage jusqu'à 39 ans).


LES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES



Grippe
Covid
Pneumocoque

- Système immunitaire faible
Risque plus élevé d'être malade et de faire des formes graves
- Vaccinations spécifiques : grippe, covid, pneumocoque
- Protection par l'entourage : mise à jour des vaccinations dont ROR (rougeole - oreillon - rubéole) et varicelle

LES MALADES CHRONIQUES ET LES PERSONNES ÂGÉES



Grippe
Covid
Pneumocoque
VRS

La vaccination réduit le risque de formes graves


- grippe
- covid
- pneumocoque
- zona: 65 ans - 74 ans
- VRS (virus respiratoire syncytial)

*Pour les +65 ans avec pathologies respiratoires ou cardiaques
Pour les +75 ans*



Avec votre pharmacien parlez prévention,

parlez



La vaccination est un geste simple et reste le moyen le plus efficace pour prévenir les formes graves des infections . Je me vaccine, je me protège, je nous protège.

LES FEMMES ENCEINTES



Grippe
Covid
Coqueluche
VRS (virus respiratoire syncytial)

- Avant l'arrêt de la contraception : mise à jour de la vaccination dont ROR (rougeole - oreillon - rubéole) et varicelle
- Pendant la grossesse
 - dès le 1er trimestre : grippe et covid
 - à partir du 2e trimestre : coqueluche
 - au 8ème mois : VRS (notamment bronchiolite)

LES NOURRISSONS



VRS
Coqueluche
Coconing

- Dès la naissance : traitement préventif contre la bronchiolite (bébés nés entre octobre et février)
- 1ères vaccinations dès 2 mois
- Vaccinations des professionnels de santé et de la petite enfance
- Vaccinations de l'entourage familial

**Epidémie coqueluche en cours :
rappel si dernière injection date de + 5 ans**

- pour les professionnels de la petite enfance
- pour l'entourage familial si absence de vaccination de la mère pendant la grossesse



La vaccination contre la coqueluche est à faire à **CHAQUE** grossesse même si la mère a été vaccinée peu de temps avant de tomber enceinte. Si la mère n'a pas été vaccinée pendant la grossesse, la vaccination doit se faire avant la sortie de la maternité même si elle allaite son enfant.



L'ENTOURAGE DES PLUS FRAGILES



Je vérifie mes vaccinations dont ROR et varicelle



Je me vaccine contre :

- la grippe
- le covid
- la coqueluche
- Pour les - 25 ans et dernier rappel date de + 5 ans
- Pour les + 25 ans et dernier rappel date de + 10 ans



Un rappel vaccinal contre la coqueluche est recommandé pour les adolescents entre 11 et 13 ans et pour tous les adultes de 25 ans (avec rattrapage jusqu'à 39 ans).

LES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES



Grippe
Covid
Pneumocoque

- Système immunitaire faible
Risque plus élevé d'être malade et de faire des formes graves
- Vaccinations spécifiques : grippe, covid, pneumocoque
- Protection par l'entourage : mise à jour des vaccinations dont ROR (rougeole - oreillon - rubéole) et varicelle

LES MALADES CHRONIQUES ET LES PERSONNES ÂGÉES



Grippe
Covid
Pneumocoque
VRS

La vaccination réduit le risque de formes graves


- grippe
- covid
- pneumocoque
- zona: 65 ans - 74 ans
- VRS (virus respiratoire syncytial)

*Pour les +65 ans avec pathologies respiratoires ou cardiaques
Pour les +75 ans*




Avec votre sage-femme parlez prévention,

parlez



La vaccination est un geste simple et reste le moyen le plus efficace pour prévenir les formes graves des infections . Je me vaccine, je me protège, je nous protège.

LES FEMMES ENCEINTES



Grippe
Covid
Coqueluche
VRS (virus respiratoire syncytial)

- Avant l'arrêt de la contraception : mise à jour de la vaccination dont ROR (rougeole - oreillon - rubéole) et varicelle
- Pendant la grossesse
 - dès le 1er trimestre : grippe et covid
 - à partir du 2e trimestre : coqueluche
 - au 8ème mois : VRS (notamment bronchiolite)

LES NOURRISSONS



VRS
Coqueluche
Coconing

- Dès la naissance : traitement préventif contre la bronchiolite (bébés nés entre octobre et février)
- 1ères vaccinations dès 2 mois
- Vaccinations des professionnels de santé et de la petite enfance
- Vaccinations de l'entourage familial

**Epidémie coqueluche en cours :
rappel si dernière injection date de + 5 ans**

- pour les professionnels de la petite enfance
- pour l'entourage familial si absence de vaccination de la mère pendant la grossesse



La vaccination contre la coqueluche est à faire à CHAQUE grossesse même si la mère a été vaccinée peu de temps avant de tomber enceinte. Si la mère n'a pas été vaccinée pendant la grossesse, la vaccination doit se faire avant la sortie de la maternité même si elle allaite son enfant.



L'ENTOURAGE DES PLUS FRAGILES



Je vérifie mes vaccinations dont ROR et varicelle




Je me vaccine contre :

- la grippe
- le covid
- la coqueluche
- Pour les - 25 ans et dernier rappel date de + 5 ans
- Pour les + 25 ans et dernier rappel date de + 10 ans



Un rappel vaccinal contre la coqueluche est recommandé pour les adolescents entre 11 et 13 ans et pour tous les adultes de 25 ans (avec rattrapage jusqu'à 39 ans).


LES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES



Grippe
Covid
Pneumocoque

- Système immunitaire faible
Risque plus élevé d'être malade et de faire des formes graves
- Vaccinations spécifiques : grippe, covid, pneumocoque
- Protection par l'entourage : mise à jour des vaccinations dont ROR (rougeole - oreillon - rubéole) et varicelle

LES MALADES CHRONIQUES ET LES PERSONNES ÂGÉES



Grippe
Covid
Pneumocoque
VRS

La vaccination réduit le risque de formes graves

- grippe
- covid
- pneumocoque
- zona: 65 ans - 74 ans
- VRS (virus respiratoire syncytial)

*Pour les +65 ans avec pathologies respiratoires ou cardiaques
Pour les +75 ans*



Avec votre infirmier.e parlez prévention,

parlez

VACCINATION

La vaccination est un geste simple et reste le moyen le plus efficace pour prévenir les formes graves des infections. Je me vaccine, je me protège, je nous protège.

LES FEMMES ENCEINTES



Grippe
Covid
Coqueluche
VRS (virus respiratoire syncytial)

- Avant l'arrêt de la contraception : mise à jour de la vaccination dont ROR (rougeole - oreillon - rubéole) et varicelle
- Pendant la grossesse
 - dès le 1er trimestre : grippe et covid
 - à partir du 2e trimestre : coqueluche
 - au 8ème mois : VRS (notamment bronchiolite)

LES NOURRISSONS



VRS
Coqueluche
Coconing

- Dès la naissance : traitement préventif contre la bronchiolite (bébés nés entre octobre et février)
- 1ères vaccinations dès 2 mois
- Vaccinations des professionnels de santé et de la petite enfance
- Vaccinations de l'entourage familial

**Epidémie coqueluche en cours :
rappel si dernière injection date de + 5 ans**

- pour les professionnels de la petite enfance
- pour l'entourage familial si absence de vaccination de la mère pendant la grossesse



La vaccination contre la coqueluche est à faire à CHAQUE grossesse même si la mère a été vaccinée peu de temps avant de tomber enceinte. Si la mère n'a pas été vaccinée pendant la grossesse, la vaccination doit se faire avant la sortie de la maternité même si elle allaite son enfant.



Grippe
Covid
Coqueluche

L'ENTOURAGE DES PLUS FRAGILES



Je vérifie mes vaccinations dont ROR et varicelle



Je me vaccine contre :

- la grippe
- le covid
- la coqueluche
- Pour les - 25 ans et dernier rappel date de + 5 ans
- Pour les + 25 ans et dernier rappel date de + 10 ans



Un rappel vaccinal contre la coqueluche est recommandé pour les adolescents entre 11 et 13 ans et pour tous les adultes de 25 ans (avec rattrapage jusqu'à 39 ans).

LES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES



Grippe
Covid
Pneumocoque

- Système immunitaire faible
Risque plus élevé d'être malade et de faire des formes graves
- Vaccinations spécifiques : grippe, covid, pneumocoque
- Protection par l'entourage : mise à jour des vaccinations dont ROR (rougeole - oreillon - rubéole) et varicelle

LES MALADES CHRONIQUES ET LES PERSONNES ÂGÉES



Grippe
Covid
Pneumocoque
VRS

La vaccination réduit le risque de formes graves

- grippe
- covid
- pneumocoque
- zona: 65 ans - 74 ans
- VRS (virus respiratoire syncytial)

*Pour les +65 ans avec pathologies respiratoires ou cardiaques
Pour les +75 ans*

