



De quoi parle t'on ?

Les infections invasives à méningocoques (méningites, septicémies) sont rares mais potentiellement mortelles. Les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents y sont les plus exposés.

Depuis 2024, il y a eu une forte augmentation des infections graves causées par le méningocoque en France.

Quels sont les signes de la maladie ?

Forte fièvre, maux de tête violents, vomissements
Raideur de nuque, sensibilité à la lumière
Taches rouges ou violettes sur la peau

appelez



Comment prévenir ?

La vaccination est le seul moyen de prévention efficace.

OBLIGATOIRE

POUR LES NOURRISSONS depuis le 1er janvier 2025

type de méningocoque	3 mois	5 mois	6 mois	12 mois
ACWY			1 ^e injection	2 ^e injection
B	1 ^e injection	2 ^e injection		3 ^e injection

Les nourrissons ayant débuté un schéma vaccinal avec un vaccin contre le méningocoque C (1^{ère} dose à 5 mois) et qui doivent recevoir une 2^{ème} dose à 12 mois en 2025, seront vaccinés avec un vaccin contre les méningocoques ACWY

RECOMMANDÉE

POUR LES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES (ACWY)

- de 11 à 14 ans (1 dose, quel que soit le schéma vaccinal antérieur)
- rattrapage ACWY de 15 à 24 ans révolus.

POUR LES PERSONNES IMMUNODEPRIMÉES ET LEUR ENTOURAGE (ACWY et B)

POUR LES VOYAGEURS

EN SAVOIR PLUS



Avec votre médecin, parlez prévention,
parlez

