





¹ Personnes : ayant reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ; sous chimiothérapie lymphopénisante ; traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ; **LLC et aux personnes atteintes de certains types de lymphomes traités par anti-CD20.**; dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés; au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif/² **Pendant la période estivale, possibilité de délai entre 2 doses 21 à 49 j (Pfizer ou Moderna)**



¹ Personnes : ayant reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ; sous chimiothérapie lymphopénisante ; traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) LLC et aux personnes atteintes de certains types de lymphomes traités par anti-CD20. ; dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés; au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif.

² Infection prouvée par Test PCR positif de plus de 15 j après la 1^{ère} injection ou test sérologique anti-N positif de plus de 15 j après la 1^{ère} injection