

# 2026

## Calendrier simplifié des vaccinations

### Vaccinations obligatoires pour les nourrissons

Âge approprié	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	65 ans et +
<b>BCG</b>														
<b>DTP et Coqueluche</b>													Tous les 20 ans	Tous les 10 ans
<b>Hib</b>														
<b>Hépatite B</b>														
<b>Pneumocoque</b>														
<b>ROR</b>														
<b>Méningocoques ACWY</b>														
<b>Méningocoque B</b>														
<b>Rotavirus</b>														
<b>HPV</b>														
<b>Grippe</b>														Tous les ans
<b>Covid-19</b>														Tous les ans
<b>Zona</b>														
<b>VRS*</b>														75 ans et +

\*Les nourrissons doivent être immunisés contre le VRS soit par vaccination de la femme enceinte, soit après leur naissance.

## Tuberculose (BCG)

La vaccination contre la tuberculose est recommandée chez les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans.

## Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite Coqueluche (DTcaP)

Les doses se font aux âges fixes prévus dans le calendrier. Pour les personnes non vaccinées, le rattrapage s'effectue en 3 doses avec un intervalle de 2 mois entre la 1<sup>re</sup> et la 2<sup>e</sup> dose et un intervalle de 6 mois entre la 2<sup>e</sup> et la 3<sup>e</sup>.

Les femmes enceintes doivent recevoir une dose de dTcaP à chaque grossesse pour protéger leur nourrisson.

## Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Pour les enfants n'ayant pas été vaccinés, un rattrapage est possible jusqu'à l'âge de 5 ans.

## Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1<sup>re</sup> année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

## Pneumocoque

La vaccination est obligatoire chez les nourrissons, le rattrapage peut être effectué jusqu'à l'âge de 24 mois. Cette vaccination est aussi recommandée à l'ensemble des personnes de 65 ans et plus.

## Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu 2 doses de vaccin à au moins un mois d'intervalle (ou 3 doses si la première dose a été reçue avant 12 mois).

## Méningocoques ACWY

La vaccination est obligatoire chez les nourrissons jusqu'à 24 mois. Le rattrapage peut s'effectuer jusqu'à l'âge de 5 ans. Pour les adolescents et jeunes adultes non vaccinés avant 14 ans, un rattrapage vaccinal est recommandé entre 15 et 24 ans.

## Méningocoque B

La vaccination est obligatoire chez les nourrissons jusqu'à 24 mois. Le rattrapage peut s'effectuer jusqu'à l'âge de 5 ans. Pour les adolescents non vaccinés, un rattrapage est possible entre 15 et 24 ans.

## Rotavirus

Recommandée à tous les nourrissons à partir de 2 mois. 2 à 3 doses (par voie orale) sont nécessaires selon le vaccin.

## Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 26 ans inclus.

## Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de

65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité (IMC > 40 kg/m<sup>2</sup>). La vaccination contre la grippe peut aussi être proposée à tous les enfants de 2 à 17 ans.

## Covid-19

En automne, en plus des personnes à risque ciblées par la vaccination grippe, la vaccination contre le Covid-19 est aussi recommandée aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21.

Au printemps, la vaccination est recommandée pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents d'EHPAD et USLD, et les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

## Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes de 65 ans et plus. 2 doses espacées d'au moins 2 mois sont nécessaires.

## VRS

La vaccination est recommandée aux personnes âgées de 75 ans et plus. Elle est également recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement broncho pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

Pour en savoir plus



VACCINATION  
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

